

【 診療科:血液内科 】
 【 レジメン登録番号:IG-60 】

〈 CHOEP療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)															
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	21				
オンコビン	1.4mg/m ² (max2mg)	div	○															
アドリアシン	50mg/m ²	div	○															
エトポシド	100mg/m ²	div	○	○	○													
エンドキサン	750mg/m ²	div	○															
プレドニン	100mg/body	p.o	○	○	○	○	○											

【1コース期間:14~21日】 【総コース数:6~8コース】

【適応癌種:悪性リンパ腫】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ RB	div(全開で)
	生食 50mL	
Rp.2	オンコビン 1.4mg/m ²	div(全開で)
	生食 50mL	
Rp.3	アドリアシン 50mg/m ²	div(30分で)
	5%Glu 100mL	
Rp.4	エトポシド 100mg/m ²	div(1時間で)
	5%Glu 250mL	
Rp.5	エンドキサン 750mg/m ²	div(2時間で)
	生食 500mL	

<day2~3>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ RB	div(全開で)
	生食 50mL	
Rp.2	エトポシド 100mg/m ²	div(1時間で)
	5%Glu 250mL	

【参考文献:Pfreundschuh M et al. Blood 2004;104:626-633】

【備考:】

【変法情報:】

】
 】
 〕