

【 診療科:整形外科 】  
 【 レジメン登録番号:OP-05 】

〈 AI療法(悪性骨・軟部腫瘍) 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)																
			1	2	3	4	5	6	7	8	.....	15	.....	21					
イホマイド	2g/m <sup>2</sup>	div	○	○	○	○	○												
アドリアシン	30mg/m <sup>2</sup>	div	○	○															

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: 6コース】

【適応癌種: 悪性骨・軟部腫瘍】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

〈day1〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	アプレピタントカプセル 125mg	p.o

〈day2-3〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	アプレピタントカプセル 80mg	p.o

〈day1〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ウロミテキサン 800mg	div(2時間で)
	ソルデム1 500mL	
Rp.2	ウロミテキサン 650mg/m <sup>2</sup>	div(8時間ごと)
	強カネオミノファーゲンシー 1A	
	メイロン20mL 2A	
	ソルデム3A 1000mL	
Rp.3	デキサート 9.9mg	側管div(30分で)
	5HT <sub>3</sub> Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	イホマイド 2g/m <sup>2</sup>	div(4時間で) <sup>※1</sup>
	生理食塩水 500mL	
Rp.5	5HT <sub>3</sub> Blocker 1A	側管div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.6	フロセミド 20mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.7	アドリアシン 30mg/m <sup>2</sup>	div(24時間で)
	生理食塩水 250mL	

〈day2〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ウロミテキサン 650mg/m <sup>2</sup>	div(8時間ごと)
	強カネオミノファーゲンシー 1A	
	メイロン20mL 2A	
	ソルデム3A 1000mL	
Rp.2	デキサート 3.3mg	側管div(30分で)
	5HT <sub>3</sub> Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	イホマイド 2g/m <sup>2</sup>	div(4時間で) <sup>※1</sup>
	生理食塩水 500mL	
Rp.4	5HT <sub>3</sub> Blocker 1A	側管div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.5	フロセミド 20mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.6	アドリアシン 30mg/m <sup>2</sup>	div(24時間で)
	生理食塩水 250mL	

〈day3-5〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ウロミテキサン 650mg/m <sup>2</sup>	div(8時間ごと)
	強カネオミノファーゲンシー 1A	
	メイロン20mL 2A	
	ソルデム3A 1000mL	
Rp.2	デキサート 3.3mg	側管div(30分で)
	5HT <sub>3</sub> Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	イホマイド 2g/m <sup>2</sup>	div(4時間で) <sup>※1</sup>
	生理食塩水 500mL	
Rp.4	5HT <sub>3</sub> Blocker 1A	側管div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.5	フロセミド 20mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	

〈day6〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ウロミテキサン 650mg/m <sup>2</sup>	div(8時間ごと) <sup>※2</sup>
	強カネオミノファーゲンシー 1A	
	メイロン20mL 2A	
	ソルデム3A 1000mL	

【参考文献:Jan J Clin Oncol,2015,45(6) 555-561】

【備考:①アドリアシンは総投与量を360mg/m<sup>2</sup>以下とする。

【備考 :※1 メイン120mL/h同時投与。】

【備考 :※2 メイン16時にて終了。】

【変法情報:

】