

【 診療科: 口腔外科 】
 【 レジメン登録番号: OS-04 】

〈 放射線併用CDDP療法 〉

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| シスプラチン | 100mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射線照射 | 2Gy/day | 体外照射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: 3 コース】 ※放射線照射スケジュールは備考④参照

【適応癌種: 口腔扁平上皮癌】

【時期: 術前、**術後**、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
| | | | |
| | | | |

投与プロトコール

〈day1〉

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|--------------------------------|-----------------|
| Rp.1 | アプレピタントカプセル 125mg | p.o.(Rp.4の30分前) |
| Rp.2 | フィジオ140 500mL | div(330mL/h) |
| Rp.3 | マグネゾール 10mL | div(330mL/h) |
| | フィジオ140 500mL | |
| Rp.4 | デキサート 9.9mg | div(30分で) |
| | 5-HT ₃ R Blocker 1A | |
| | 生理食塩水 100mL | |
| Rp.5 | マンニトールS 300mL | div(30分で) |
| Rp.6 | シスプラチン 100mg/m ² | div(2時間で) |
| | 生理食塩水 500mL ^{※1} | |
| Rp.7 | フィジオ140 500mL | div(250mL/h) |
| Rp.8 | フィジオ140 500mL | div(250mL/h) |

〈day2~4〉

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|------------------|----------------|
| Rp.1 | アプレピタントカプセル 80mg | p.o.(day2~3のみ) |
| Rp.2 | デキサート 6.6mg | 側管div(30分で) |
| | 生理食塩水 100mL | |

【参考文献: NCCN Guidelines Version1, 2012 Very Advanced Head and Neck Cancer】

【備考①: ※1...生理食塩水の量はシスプラチンと合わせて500mLとなるようにする。】

【備考②: 患者の状態により、第3日目~リフレックス錠(15mg)0.5錠 分1 寝る前 5日間を処方することあり。(錠剤粉砕は、病棟で行う。)】

【備考③: 放射線照射は、2Gy/dayを、週5日間、6週間 + boostで6Gy/回(照射日は放射線治療科にて決定、合計66Gy照射。)】

【備考④: リンパ節転移を多数認め、リンパ節被膜外にも転移を認めるようなハイリスク群に対しては、手術後から実施する。】