

【 診療科: 乳腺外科 】

【 レジメン登録番号: SB-47 】

〈 Pembrolizumab+PTX+CBDCA (AUC:1.5) 療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	21			
キイトルーダ	200mg/body	div	○														
パクリタキセル	80mg/m ²	div	○						○						○		
カルボプラチン	AUC:1.5	div	○						○						○		

【1コース期間: 21 日】

【総コース数: 4コース*¹】

【適応癌種: 乳癌 (TNBC) 】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路 (速度)
Rp.1	キイトルーダ 200mg/body	div (30分) * ³
	生理食塩水 100mL * ²	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div (全開)
Rp.3	ポラミン 5mg	div (全開)
	生理食塩水 50mL	
Rp.4	デキサート 4.95mg	div (30分)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	H ₂ blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.5	パクリタキセル 80mg/m ²	div (60分) * ³
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.6	カルボプラチン (AUC:1.5) × (GFR+25)	div (60分)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.7	生理食塩水 50mL	div (全開)

<day8.15>

Rp	薬剤名	投与経路 (速度)
Rp.1	ポラミン 5mg	div (全開)
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	デキサート 4.95mg	div (30分)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	H ₂ blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	パクリタキセル 80mg/m ²	div (60分) * ³
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.4	カルボプラチン (AUC:1.5) × (GFR+25)	div (60分)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.5	生理食塩水 50mL	div (全開)

【参考文献: N Engl J Med.2022;386:556-67、キイトルーダ点滴静注添付文書】

【備考: ①※4コース終了後、Pembrolizumab+EC療法へ移行する。】

【備考: ②※最終濃度が1~10mg/mLとなるように調製すること。】

【備考: ③※インラインフィルター (0.2又は0.22 μ m) を用いて投与すること。】