

【 診療科:消化器外科】
 【 レジメン登録番号:SG-103 】

〈GCS療法〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)												
			1	2	3	4	5	6	7	8	14			
ジェムザール	1000mg/m ²	div	○												
シスプラチン	25mg/m ²	div	○												
S-1	BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA<1.5m ² 100mg/day BSA≥1.5m ² 120mg/day	p.o.	夕 ←				継続服用								→ 朝

【1コース期間: 14 日】 【総コース数:制限なし】

【適応癌種: 胆道癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

	Rp	薬剤名	投与経路(速度)
day1	Rp.1	フィジオ140 500mL	div(1時間で)
	Rp.2	5-HT ₃ R Blocker 1V	div(全開で)
		デキサート 9.9mg	
		生理食塩水 100mL	
	Rp.3	ジェムザール 1,000mg/m ²	div(30分で)
		5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.4	シスプラチン 25mg/m ²	div(1時間で)	
	生理食塩水 500mL		
Rp.5	ラシックス 20mg	div(全開で)	
	生理食塩液 50mL		
Rp.6	フィジオ140 500mL	div(1時間で)	

【参考文献: 胆道癌診療ガイドライン改訂第3版、Cancer Chemother Pharmacol(2015)75:293-300】

【備考: S-1服用は分2、Day1夕～Day8朝】

【変法情報:

】