

【 診療科:消化器外科 】

【 レジメン登録番号:SG-124 】

〈 Nivolumab+Ipilimumab療法(悪性黒色腫) 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)	
			1 21
オプジーボ	80mg/body	div	○	
ヤーボイ	3mg/kg	div	○	

【1コース期間: 21日】

【総コース数:4コース】

【適応癌種:悪性黒色腫】

【時期:術前、術後、**手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

〈day1〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	オプジーボ 80mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL ^{※1}	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(30分で)
Rp.3	ヤーボイ 3mg/kg	div(30分で)
	生理食塩水 30mL ^{※2}	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(30分で)

【参考文献:オプジーボ点滴静注添付文書、ヤーボイ点滴静注液添付文書】

【備考:※1 投与時の総液量は体重30kg以上の患者には150mL以下、体重30kg未満の患者には100mL以下とする。】

【備考:※2 ヤーボイは最終濃度が1~4mg/mLとなるように希釈すること。】

【備考:オプジーボとヤーボイはインラインフィルター(0.2又は0.22μm)を用いて投与すること。】

【備考:4コース目以降Nivolumab単剤療法へ移行する。】