

【 診療科:消化器外科 】
 【 レジメン登録番号:SG-34 】

〈 IRIS療法【大腸癌用】 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)													
			1	2	3	4	5	6	7	14	15	28		
イリノテカン	125mg/m ²	div	○												○	
TS-1	80~120mg/body	p.o.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	←継続投与 →	○			

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: コース】

【適応癌種: 切除不能大腸癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
WBC	3,000以下	中止	3,000以上
Plt	10万以下	中止	10万以上
T-Bil	3以上	中止	3以下

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	YDソリタT3 200mL	div(80mL/h) 終了後抜針, 残破棄
Rp.2	デキサート 6.6mg	div(30分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
Rp.3	生理食塩水 100mL	div(90分で)
	イリノテカン 125mg/m ²	
	生理食塩水 500mL	

【参考文献:無作為第Ⅲ相試験(FIRIS study)でFOLFIRIに対し非劣性が証明されている】

【備考:TS-1投与量 BSA<1.25m²,80mg/day; 1.25≤BSA<1.5,100mg/day; BSA≥1.5,120mg/day】

【変法情報:】