

【 診療科:消化器外科 】  
 【 レジメン登録番号:SG-77 】

### < アバスチン+XELOX療法 >

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)										
			1	2	3	4	.....	14	15	.....	21		
アバスチン	7.5mg/kg	div	○										
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	div	○										
ゼローダ	< 1.36m <sup>2</sup> 1,200mg/回 1.36~1.65m <sup>2</sup> 1,500mg/回 1.66~1.95m <sup>2</sup> 1,800mg/回 1.96m <sup>2</sup> ≤ 2,100mg/回	p.o.	夕	← 1日2回 朝・夕食後 → 2週間投与						朝			

【1コース期間: 21 日】

【総コース数:制限なし】

【適応癌種: 大腸癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
※ゼローダ錠適正使用ガイド参照			

#### 投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	YDソリタT3 200mL	div(40mL/h)
Rp.2	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	div(全開で)
	デキサート 9.9mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	アバスチン 7.5mg/kg	div(メイン止め)
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	オキサリプラチン 130mg/m <sup>2</sup>	div(メイン止め、2時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	

※初回90分、2回目は60分でも可。  
3回目以降は30分でも可。

【参考文献:British Journal of Cancer(2011)105,58-64】

【備考:ゼローダ投与は分2、day1夕食後~day15朝食後

】