

【 診療科:脳神経外科】
 【 レジメン登録番号:SN-03 】

〈 Temozolomide + Bevacizumab療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	5	6	715.....	28						
アバステン	10mg/kg	div	○														○
テモダール	150mg/m ²	div	○	○	○	○	○										

【1コース期間:28日】 【総コース数:制限なし】

【適応癌種:悪性神経膠腫(再発)】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp.1	イメンドカプセル 125mg	p.o.
Rp.2	生理食塩水 100mL	div(ルートキープ用)
Rp.3	アバステン 10mg/kg	div(90分) ^{※1}
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	デキサート 3.3mg	div(15分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.5	テモダール 150mg/m ² ^{※2}	div(90分で)
	注射用水 1Vあたり41mL	
	生理食塩水 200mL	
Rp.6	生理食塩水 100mL	全開で

<day2~5>

Rp.1	イメンドカプセル 80mg	p.o.(day2~3のみ)
Rp.2	生理食塩水 100mL	div(ルートキープ用)
Rp.3	デキサート 3.3mg	div(15分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.4	テモダール 150mg/m ² ^{※2}	div(90分で)
	注射用水 1Vあたり41mL	
	生理食塩水 200mL	
Rp.5	生理食塩水 100mL	全開で

<day15>

Rp.1	生理食塩水 100mL	div(ルートキープ用)
Rp.2	アバステン 10mg/kg	div(投与時間は備考※1参照)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	生理食塩水 100mL	全開で

【備考※1:初回90分、2回目60分、3回目以降30分へ短縮可能】
 【備考※2:2クール目以降、200mg/m²に増量することが可能。】
 【変法情報:】