

【 診療科:呼吸器外科 】
 【 レジメン登録番号:ST-1 】

〈 weekly ナベルビン+アクプラ療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)															
			1	2	3	8	15	22	29	35			
ナベルビン	10mg/m ²	div	○					○					○					○
アクプラ	30mg/m ²	div	○					○					○					○

【1コース期間: 35 日】 【総コース数: 2 コース(計10回)】

【適応癌種:非小細胞肺癌】

【時期: 術前 **術後**、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
薬剤投与基準量	骨髄抑制(WBC<3000 or Hb<10 or PLT<10万)	中止	
薬剤投与基準量	発熱>37.5℃	中止	
薬剤投与基準量	GOT/GPT>100	中止	
薬剤投与基準量	UN/Cre 悪化	80%量または中止	
薬剤投与基準量	強度の食欲不振 or 全身倦怠感 or 嘔吐	80%量または中止	

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 3.3mg	div(10分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	アクプラ 30mg/m ²	div(60分で)
	生理食塩水 250mL	
Rp.3	ナベルビン 10mg/m ²	div(10分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	生理食塩水 100mL	div(全開で)

【参考文献:]

【備考:]

【変法情報:]