

【 診療科:泌尿器科 】
 【 レジメン登録番号:UR-5】

〈 GC療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)															
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	28				
ジェムザール	1000mg/m ²	div	○									○						○
シスプラチン	70mg/m ²	div		○														

【1コース期間: 28日】 【総コース数:4 コース】

【適応癌種: 尿路上皮癌 】

【時期: ~~術前、術後、手術不能・進行・再発~~】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
白血球数	3000未満	中断	3000以上
血小板数	10万未満	中断	10万以上

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF 500mL	div(80mL/h)
Rp.2	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(15分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	ジェムザール 1000mg/m ²	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	ソリューゲンF 500mL	div(80mL/h)

<day2>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF 500mL	40mL/h
Rp.2	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(15分で)
	デキサート 13.2mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	シスプラチン 70mg/m ²	div(120分で)
	生理食塩水(合計 500mL)	
Rp.4	ラシックス 20mg	div(120分で)
	ソリューゲンF 500mL	
Rp.5	ソリューゲンF 500mL	div(80mL/hで)

<day3>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF 500mL	div(80mL/h)
Rp.2	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(15分で)
	デキサート 6.6mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	ソリューゲンF 500mL	div(80mL/hで)

<day8,15>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF 500mL	div(80mL/h)
Rp.2	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(15分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	ジェムザール 1000mg/m ²	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	ソリューゲンF 500mL	div(80mL/h)

【参考文献:Long-Term Survival Results of a Randomized Trial Comparing Gemcitabine Plus Cisplatin, with Methotrexate , Vinblastine, Doxorubicin, Plus Cisplatin in Patients with Bladder Cancer】

【備考: イメンドを併用する場合は、day2のデキサートの投与量を6.6mgに減量すること。】

【変法情報:

】