

【 診療科:泌尿器科 】

【 レジメン登録番号:UR-30 】

〈 Pembrolizumab＋Axitinib療法 〉

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | |
|--------|------------|------|---------------|----------------|
| | | | 1 | 21 |
| キイトルーダ | 200mg/body | div | ○ | |
| インライタ | 10mg/body | p.o | ← | Day1 ~21まで内服 → |

【1コース期間: 21 日】

【総コース数: 制限なし】

【適応癌種: 腎細胞癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
| | | | |
| | | | |

投与プロトコール

〈第1日目〉

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) | 投与日 |
|------|---------------------------|-----------|---------|
| Rp.1 | キイトルーダ 200mg/body | div(30分で) | day1 |
| | 生理食塩水 100mL ^{※①} | | |
| Rp.2 | 生理食塩水 50mL | div(30分で) | day1 |
| Rp.3 | インライタ 10mg/body | p.o.(分2) | day1~21 |

【参考文献:N Engl J Med 2019;380:1116-27.】

【備考:※①インラインフィルター(0.2~5μm)を用いて投与すること。最終濃度が1~10mg/mLとなるように調製すること。】

【備考:キイトルーダは35コースまで】