

【診療科:婦人科】
 【レジメン登録番号:GY-12】

〈 BEP療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	21					
エトポシド	100mg/m ²	div	○	○	○	○	○													
シスプラチン	20mg/m ²	div	○	○	○	○	○													
ブレオ	30mg/body	div			○									○				○		

【1コース期間: 21日】 【総コース数: 3~4 コース】

【適応癌種: 胚細胞腫瘍】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

〈day1〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	リナセートF 500mL	div(120分で)
Rp.2	デキサート 9.9mg ^{※1}	div(30分で)
	パロノセトロン 0.75mg 生理食塩水 100mL	
Rp.3	エトポシド 100mg/m ²	div(180分で)
	5%ブドウ糖液 500mL	
Rp.4	マンニトールS 300mL	div(60分で)
Rp.5	シスプラチン 20mg/m ²	div(180分で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.6	リナセートF 500mL	div(120分で)
Rp.7	リナセートF 500mL	div(120分で)

〈day2〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	リナセートF 500mL	div(120分で)
Rp.2	デキサート 6.6mg ^{※1}	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	ブレオ 30mg/body	div(30分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.4	エトポシド 100mg/m ²	div(180分で)
	5%ブドウ糖液 500mL	
Rp.5	マンニトールS 300mL	div(60分で)
Rp.6	シスプラチン 20mg/m ²	div(180分で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.7	リナセートF 500mL	div(120分で)
Rp.8	リナセートF 500mL	div(120分で)

〈day3~5〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	リナセートF 500mL	div(120分で)
Rp.2	デキサート 6.6mg ^{※1}	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	エトポシド 100mg/m ²	div(180分で)
	5%ブドウ糖液 500mL	
Rp.4	マンニトールS 300mL	div(60分で)
Rp.5	シスプラチン 20mg/m ²	div(180分で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.6	リナセートF 500mL	div(120分で)
Rp.7	リナセートF 500mL	div(120分で)

〈day9,16〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ブレオ 30mg/body	div(30分で)
	生理食塩水 50mL	

【参考文献:

【備考: ※1...デキサートの投与量は、アプレビタントカプセル併用時の量で設定してあります。アプレビタント不要時はデキサート倍量。】

【変法情報: