

【 診療科:婦人科 】  
 【 レジメン登録番号:GY-31 】

〈 Cisplatin+Paclitaxel(TP)+Bevacizumab療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	.....	15	....	21			
アバステチン	15mg/kg	div	○														
パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	div	○														
シスプラチン	50mg/m <sup>2</sup>	div	○														

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: 規定なし】

【適応癌種: 子宮頸癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

〈第1日目〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	アバステチン 15mg/kg	div(初回90分、2回目60分、3回目以降30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	ポララミン 5mg	div(全開で)
	デキサート 9.9mg	
	ファモチジン 20mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	パクリタキセル 175mg/m <sup>2</sup>	div(3時間で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.5	フィジオ140 500mL	div(1時間で)
Rp.6	シスプラチン 50mg/m <sup>2</sup>	div(2時間で)
	生理食塩水 500mL <sup>※1</sup>	
Rp.7	マンニトールS 300mL	div(1時間で)
Rp.8	生理食塩水 500mL	div(2時間で)
Rp.9	リナセートF 500mL	div(2時間で)

【参考文献: N Engl J Med 2014;370:734-43、アバステチン点滴静注用添付文書、タキソール注射液添付文書】

【備考: ※1・・・第1日目のRp.6の生理食塩水の量はシスプラチンと合わせて500mLとなるようにする】

【備考: 2・・・アプレピタントを併用する。】

【変法情報: 〃】