

【 診療科:婦人科】  
 【 レジメン登録番号:GY-41 】

〈 PLD-C+Bevacizumab療法 〉

|          | 投与量                 | 投与経路 | 投与スケジュール (day) |    |
|----------|---------------------|------|----------------|----|
|          |                     |      | 1              | 28 |
| ベバシズマブBS | 15mg/kg             | div  | ○              |    |
| ドキシル     | 30mg/m <sup>2</sup> | div  | ○              |    |
| カルボプラチン  | AUC:5               | div  | ○              |    |

【1コース期間: 28 日】      【総コース数:6コース】

【適応癌種:卵巣癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
|    |    |      |          |
|    |    |      |          |

<day1>

| Rp   | 薬剤名                      | 投与経路(速度)                          |
|------|--------------------------|-----------------------------------|
| Rp.1 | ベバシズマブBS 15mg/kg         | div(初回90分、2回目60分、<br>3回目以降30分でも可) |
|      | 生理食塩水 100mL              |                                   |
| Rp.2 | デキサート 6.6mg              | div(30分で)                         |
|      | 5-HT3R blocker 1A        |                                   |
|      | 5%ブドウ糖 50mL              |                                   |
| Rp.3 | ドキシル 30mg/m <sup>2</sup> | div(60分) <sup>※1</sup>            |
|      | 5%ブドウ糖 250 mL            |                                   |
| Rp.4 | カルボプラチン AUC5             | div(60分で)                         |
|      | 5%ブドウ糖 250mL             |                                   |
| Rp.5 | 生理食塩水 50 mL              | div(フラッシュ用、全開で)                   |

【参考文献:Lancet Oncol 2020;21:699-709】

【備考:※1: インラインフィルターを使用しないこと。また、ドキシルは1mg/分をこえない速度で投与すること。

※ドキシルの累積投与量に注意すること。

※6コース終了後は増悪するまでBevericumabのみで継続する。(15mg/kg q3w)

【変法情報:

】