

【 診療科:消化器内科】
 【 レジメン登録番号:IA-27 】

〈 weekly PTX療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)																
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	28					
パクリタキセル	60~80mg/m ²	div	○											○			○		

【1コース期間: 28日】 【総コース数: コース】

【適応癌種: 胃癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
好中球数	1500未満	20%減量	1500以上
血小板数	7.5万未満	20%減量	7.5万以上
総ビリルビン	1.5以上	休薬	1.5未満
AST・ALT	正常値の2倍	休薬	正常の2倍以下
クレアチニン	2.0以上	休薬	2.0未満

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソリューゲンF 500mL	div(100mL/h)
Rp.2	ポララミン 1A	div(全開)
	デキサート 6.6mg	
	H ₂ -blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	パクリタキセル 60~80mg/m ²	div(90分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	

【参考文献:A Phase II Study of Weekly Paclitaxel as Second-line Chemotherapy for Advanced Gastric Cancer (CCOG0302 Study); ANTCANCER RESERCH 27: 2667-2672 (2007)】

【備考: ポララミンはベナ錠(50mg)内服でも可】

【変法情報: