

【 診療科:消化器内科 】
 【 レジメン登録番号:IA-44 】

〈 Durvalumab+GEM+CDDP療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	21			
イミフィンジ	1500mg/body	div	○														
ジェムザール	1000mg/m ²	div	○						○								
シスプラチン	25mg/m ²	div	○						○								

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: 8コース】

【維持療法*1】

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	28									
イミフィンジ	1500mg/body	div	○														

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: 制限なし】

【適応癌種:胆嚢・胆道癌】

【時期: 術前、術後、**手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	フィジオ140 500mL	div(1時間で)
Rp.2	イミフィンジ 1500mg/body ^{※2,3}	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL ^{※4}	
Rp.3	生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.4	5-HT ₂ R Blocker 1A	div(全開で)
	デキサート 9.9mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.5	ジェムザール 1,000mg/m ²	div(30分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.6	シスプラチン 25mg/m ²	div(1時間で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.7	フロセミド 20mg	div(全開で)
	生理食塩液 50mL	
Rp.8	フィジオ140 500mL	div(1時間で)

<day8>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	フィジオ140 500mL	div(1時間で)
Rp.2	5-HT ₂ R Blocker 1A	div(全開で)
	デキサート 9.9mg	
Rp.3	ジェムザール 1,000mg/m ²	div(30分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.4	シスプラチン 25mg/m ²	div(1時間で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.5	フロセミド 20mg	div(全開で)
	生理食塩液 50mL	
Rp.6	フィジオ140 500mL	div(1時間で)

8コース終了後の維持療法

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	イミフィンジ 1500mg/body ^{※2,3}	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL ^{※4}	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(全開で)

【参考文献:イミフィンジ点滴静注添付文書2022年12月改訂、NEJM Evid 2022;1(8)】

【備考:①※1 8コース終了後、増悪なければイミフィンジによる4週間隔の維持療法を行う。】

【備考:②※2 イミフィンジは体重が30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kgとする。】

【備考:③※3 インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を用いて投与すること。】

【備考:④※4 イミフィンジは希釈後の最終濃度が1~15mg/mLとなるように調製すること。】