

【 診療科:血液腫瘍内科】
 【 レジメン登録番号:IG-104】

〈 R-MPV-A療法(地固め療法) 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)			
			1	2	28
シタラビン	3000mg/m ²	DIV	○	○		

【1コース期間:28日】

【総コース数: 2 コース】

【適応癌種:CD20陽性中枢神経系原発悪性リンパ腫(PCNSL)】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
薬剤投与基準量	60歳以上	1500mg/m ² /回(但し必須ではない)	

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT ₃ RB 1A	div(全開で)
	ソル・マトロール(40mg) 1V	
	生理食塩液 50mL	
Rp.2	シタラビン 3000mg/m ²	div(3時間かけて)
	ソルテム3A 500mL ※	

※全量500mLとなるよう適宜調整

【参考文献:J Clin Oncol 31:3971-3979.】

【備考:ステロイド点眼剤などを予防的に投与することを考慮する。】

【備考:R-MPV-A療法(寛解導入療法)を全コース終了した後に開始する。】

【変法情報:】