【 診療科：血液腫瘍内科 】
【 レジメン登録番号：IG-117 】

〈 Pralatrexate療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール（day）							
			1	・・・	8	15	22	29	36	・・・ 49
ジフォルタ	30mg/㎡	div	○		○	○	○	○	○	

【1コース期間： 49日】　　【総コース数：制限無し】

【適応癌種：再発・又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫】

【時期： 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
薬剤投与基準量			

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路（速度）	投与日
Rp.1	ジフォルタ 30mg/㎡ 生理食塩液 50mL	div（全開で、5分以内）	day1, 8, 15, 22, 29, 36

【参考文献：ジフォルタ注射液添付文書、JCA.Cancer Sci 108 (2017)2061-2068、J Clin Oncol 29:1182-1189. 】

【備考： 本剤初回投与日の10日以上前から，葉酸として1日1回1.0～1.25mg以上を連日経口投与する。本剤の投与終了日から30日間は投与を継続する。】

【備考： 本剤初回投与日の10日以上前から，ビタミンB12として1回1mgを8～10週ごとに筋肉内投与する。本剤投与中は，投与を継続する。】

【備考：口内炎等の副作用発現軽減目的として、ホリナートの経口投与を考慮する。その場合、葉酸・ビタミンB12の投与を本剤初回投与日の7日以上前とすることができる。 】