【 診療科:血液内科 】
【 レジメン登録番号:IG-71】

〈 GDP療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	・・・・・	15	・・・・	21
ジェムザール	1000mg/㎡	div	○							○					
シスプラチン	75mg/㎡	div	○												
デキサート	33mg/body	div	○	○	○	○									

【1コース期間:21日】 【総コース数:3コース】

【適応癌種:悪性リンパ腫(再発・難治性) 】

【時期: 術前 、 術後 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT_3R Blocker 1A	div(全開で)
	生食 100mL	
Rp.2	ﾃﾞｷｻｰﾄ 16.5mg/body	div(1時間で)
	生食 100mL	
Rp.3	ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ 1000mg/㎡	div(30分かけて)
	生食 250mL	
Rp.4	生食 250mL	div(30分かけて)
Rp.5-①	ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS 300mL	div(Rp.5-②と同時投与、2時間かけて)
Rp.5-②	シスプラチン 75mg/㎡	div(Rp.5-①と同時投与、2時間かけて)
	生食 500mL※1	
Rp.6	生食 500mL	div(2時間かけて)
Rp.7	ﾃﾞｷｻｰﾄ 16.5mg/body	div(1時間で)
	生食 100mL	

<day2～4>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ﾃﾞｷｻｰﾄ 16.5mg/body	div(1時間で)
	生食 100mL	
Rp.2	ﾃﾞｷｻｰﾄ 16.5mg/body	div(1時間で)
	生食 100mL	

<day8>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT_3R Blocker 1A	div(全開で)
	生食 100mL	
Rp.2	ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ 1000mg/㎡	div(30分かけて)
	生食 250mL	

【参考文献:J Clin Oncol.2014;32:3490-6 】
【備考:・基本はCV挿入にて実施。
・メインルートの輸液量は患者の状態に合わせて別途指示。
※1・・・生理食塩水の量はシスプラチンと合わせて500mLとなるようにする。】
【変法情報:B細胞型、CD20+の場合はリツキシマブ併用を考慮する。 】
【変法情報※:デキサート注は、デキサメタゾンリン酸エステルとして40mg。 】