

【 診療科:血液腫瘍内科】  
 【 レジメン登録番号:IG-80 】

〈 sVRD療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)												
			1	...	8	...	15	...	21	22	...	28			
ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	s.c.	○					○							
レブラミド	10mg/body	p.o.	○	.....							○				
レナデックス	40mg/body	p.o.	○		○			○				○			

【1コース期間: 28日】                      【総コース数: コース】

【適応癌種:多発性骨髄腫】

【時期: 術前、術後、**手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
ボルテゾミブ		1.0mg/m <sup>2</sup> (1段階減量)	
レブラミド		5mg/day(1段階減量)	
レナデックス		20mg/day(1段階減量)	

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	ボルテゾミブ 1.3mg/m <sup>2</sup>	s.c.	day1, 15
	生理食塩水 0.8mL/V		
Rp.2	レブラミド 10mg/body	p.o.(分1)	day1~21
Rp.3	レナデックス 40mg/body	p.o.(分1)	day1, 8, 15, 22

【参考文献:Cancer Chemother Pharmacol(2016)78:1041-49】

【備考:

【変法情報:

】