

【 診療科:血液内科 】  
 【 レジメン登録番号:IG-93 】

〈 BG(Obinutuzumab+Bendamustine)療法 〉

【1コース】

|        | 投与量                 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) |   |       |   |       |    |       |    |  |
|--------|---------------------|------|---------------|---|-------|---|-------|----|-------|----|--|
|        |                     |      | 1             | 2 | ..... | 8 | ..... | 15 | ..... | 28 |  |
| トレアキシシ | 90mg/m <sup>2</sup> | div  | ○             | ○ |       |   |       |    |       |    |  |
| ガザイバ   | 1000mg/body         | div  | ○             |   |       | ○ |       |    | ○     |    |  |

【2~6コース】

|        | 投与量                 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) |   |       |       |       |    |  |  |
|--------|---------------------|------|---------------|---|-------|-------|-------|----|--|--|
|        |                     |      | 1             | 2 | ..... | ..... | ..... | 28 |  |  |
| トレアキシシ | 90mg/m <sup>2</sup> | div  | ○             | ○ |       |       |       |    |  |  |
| ガザイバ   | 1000mg/body         | div  | ○             |   |       |       |       |    |  |  |

【1コース期間:28日】 【総コース数: 6 】

【適応癌種:悪性リンパ腫(CD20+ 濾胞性リンパ腫)】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
|    |    |      |          |
|    |    |      |          |

【第1日目】

| Rp   | 薬剤名                        | 投与経路(速度)           |
|------|----------------------------|--------------------|
| Rp.1 | 5-HT <sub>3</sub> RB       | div(全開で)           |
|      | 生理食塩液 50mL                 |                    |
| Rp.2 | トレアキシシ 90mg/m <sup>2</sup> | div(1時間かけて)        |
|      | 生理食塩液 250mL                |                    |
| Rp.3 | デキサート 9.9mg                | div(30分かけて)        |
|      | 生理食塩液 50mL                 |                    |
| Rp.4 | 生理食塩液 50mL                 | div(30分かけて)        |
| Rp.5 | アセトアミノフェン 400mg            | p.o. <sup>※1</sup> |
|      | ポララミン 4mg                  |                    |
| Rp.6 | ガザイバ 1000mg/body           | div(添付文書参考に)       |
|      | 生理食塩液 199mL                |                    |
| Rp.7 | 生理食塩液 50mL                 | div(全開)            |

【第2日目】

| Rp   | 薬剤名                        | 投与経路(速度)    |
|------|----------------------------|-------------|
| Rp.1 | 5-HT <sub>3</sub> RB       | div(全開で)    |
|      | 生理食塩液 50mL                 |             |
| Rp.2 | トレアキシシ 90mg/m <sup>2</sup> | div(1時間かけて) |
|      | 生理食塩液 250mL                |             |
| Rp.3 | 生理食塩液 50mL                 | div(全開)     |

【第8、15日目(1コース目のみ)】

| Rp   | 薬剤名              | 投与経路(速度)           |
|------|------------------|--------------------|
| Rp.1 | デキサート 9.9mg      | div(30分かけて)        |
|      | 生理食塩液 50mL       |                    |
| Rp.2 | 生理食塩液 50mL       | div(30分かけて)        |
| Rp.3 | アセトアミノフェン 400mg  | p.o. <sup>※1</sup> |
|      | ポララミン 4mg        |                    |
| Rp.4 | ガザイバ 1000mg/body | div(添付文書参考に)       |
|      | 生理食塩液 199mL      |                    |
| Rp.5 | 生理食塩液 50mL       | div(全開)            |

【参考文献:N Engl Med 2017;377:1331-44】

【備考:6コース投与終了後、ガザイバ単独療法を2ヶ月毎に2年間投与する。】

【備考:※1 ガザイバ投与の30分~60分前に投与を行うこと。】

【備考:インラインフィルター(0.2又は0.22µm)を用いて投与すること。】

【備考:ガザイバの前投薬のデキサートは適宜減量・中止する場合あり。】

【変法情報:】

】  
 )  
 )  
 )  
 )  
 )