

【 診療科:呼吸器内科 】
 【 レジメン登録番号:IP-13 】

〈 PEM(アリムタ)単剤療法 〉

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|-------|----|--|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 15 | | 21 | | | |
| アリムタ | 500mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | | | | | | |

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: 】

【適応癌種: 悪性胸膜中皮腫・非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|-----|--------------|------|----------|
| WBC | 3,000 μL/未満 | 中止 | |
| Plt | 100,000/μL未満 | 中止 | |

投与プロトコール

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|---------------------------|-----------|
| Rp.1 | デキサート 6.6mg | div(30分で) |
| | 生理食塩水 100mL | |
| Rp.2 | アリムタ 500mg/m ² | div(10分で) |
| | 生理食塩水 100mL | |

【参考文献:

【備考: 重篤な副作用の発現を軽減するため、葉酸及びビタミンB₁₂を投与すること。

【 ※葉酸: 本剤初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。
 なお、本剤の投与を中止又は終了する場合には、本剤最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。

【 ※ビタミンB₁₂: 本剤初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB₁₂として1回1mgを筋肉内投与する。
 その後、本剤投与期間中及び投与中止後22日目まで9週毎(3コース毎)に1回投与する。

【変法情報:

】
 】【
 】【
 】【