【 診療科：呼吸器内科 】
【 レジメン登録番号：IP-46 】

〈 Ramucirumab＋Erlotinib療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール（day）
			1 2 3 4 5 6 7 8 ・・・・・ 14
サイラムザ	10mg/kg	div	○
タルセバ	150mg/body	p.o.	← Day1-14まで内服 →

【1コース期間： 14 日】　　【総コース数：制限なし 】

【適応癌種： 非小細胞肺癌 】

【時期： 術前 、 術後 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

〈day1〉

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	ポララミン 5mg 生理食塩水 50mL	div（15分で）
Rp.2	サイラムザ 10mg/kg 生理食塩水 250mL	div（60分で） 初回投与の忍容性が良好であれば、 2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
Rp.3	生理食塩水 100mL	div（60分で、3サイクル目 以降全開投与でも可）

〈day1-14〉

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	タルセバ 150mg/day	p.o,（1日1回）

【参考文献：Lancet Oncol 2019;20:1655-69 】
【備考： 】