

【 診療科:整形外科】

【 レジメン登録番号:OP-03b 】

## 〈 ADR療法(1時間投与) 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)																	
			1	2	3	4	5	.....	21											
アドリアシン	60~75mg/m <sup>2</sup>	div	○																	

【1コース期間: 21日】

【総コース数: 術後:2コース、進行・再発:累積投与量上限まで】

【適応癌種: 骨肉腫、非円形細胞の軟部肉腫】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

### 投与プロトコール

〈day1〉	Rp	薬剤名	投与経路(速度)
	Rp.1	アプレピタントカプセル 125mg	p.o

〈day2-3〉	Rp	薬剤名	投与経路(速度)
	Rp.1	アプレピタントカプセル 80mg	p.o

〈day1〉	Rp	薬剤名	投与経路(速度)
	Rp.1	デキサート 9.9mg	div(15分で)
		5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	
		生理食塩水 50mL	
Rp.2	アドリアシン 60~75mg/m <sup>2</sup>	div(1時間で)	
	生理食塩水 100mL		

【参考文献: J Orthop Sci (2009) 14:397-404】

【備考: アドリアシンは総投与量を420mg/m<sup>2</sup>以下とする。】

【変法情報:】