【 診療科：整形外科】
【 レジメン登録番号：OP-04 】

〈 IFO大量療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール（day）						
			1	2	3	4	5	・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
イホマイド	3g/㎡	div	○	○	○	○	○		

【1コース期間： 21日】　　【総コース数： 術前；2コース、術後；6コース 】

【適応癌種： 骨肉腫 】

【時期： 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

〈day1〉

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	アプレピタントカプセル 125mg	p.o

〈day2-3〉

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	アプレピタントカプセル 80mg	p.o

〈day1〉

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	ウロミテキサン 800mg	div（2時間で）
	ソルデム1 500mL	
Rp.2	ウロミテキサン 1000mg/m^2	div（8時間ごとに持続）
	強力ネオミノファーゲンシー 1A	
	メイロン20mL 2A	
	ソルデム3A 1000mL	
Rp.3	デキサート 9.9mg	div（30分で）
	5-HT_3R Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	イホマイド 3g/㎡	div（4時間で）※1
	生理食塩水 500mL	
Rp.5	フロセミド注 20mg	div（30分で）
	生理食塩水 100mL	

〈day2～5〉

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	ウロミテキサン 1000mg/m^2	div（8時間ごとに持続）
	強力ネオミノファーゲンシー 1A	
	メイロン20mL 2A	
	ソルデム3A 1000mL	
Rp.2	デキサート 6.6mg	div（30分で）
	5-HT_3R Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	イホマイド 3g/㎡	div（4時間で）※1
	生理食塩水 500mL	
Rp.4	フロセミド注 20mg	div（30分で）
	生理食塩水 100mL	

〈day6〉

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	ウロミテキサン 1000mg/m^2	div（8時間ごとに持続）※2
	強力ネオミノファーゲンシー 1A	
	メイロン20mL 2A	
	ソルデム3A 1000mL	

【参考文献：J Orthop Sci (2009) 14:397-404 】
【備考 ：※ イホマイドの100%量のウロミテキサンを持続投与（初回はローディング） 】
【備考 ：※1 メイン120mL/h同時投与。 】
【備考 ：※2 メイン16時にて終了。 】
【変法情報： 】