

【診療科:口腔外科】
 【レジメン登録番号:OS-06】

〈アービタックス+カルボプラチン+5-FU併用療法〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	15	21			
アービタックス	400mg/m ² (2回目~250mg/m ²)	div	○									○					○
カルボプラチン	AUC:5	div	○														
フルオロウラシル	800~1000mg/m ²	div	○	○	○	○											

【1コース期間: 21 日】 【総コース数:最大6コース(アービタックス単剤にて継続は可)】

【適応癌種: 頭頸部癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

〈day1〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	生理食塩水 1000mL	div(4時間で)
Rp.2-1	ソルデム3A 1000mL	div(24時間持続)
	フルオロウラシル 800~1000mg/m ²	
Rp.2-2	デキサート 9.9mg ^{※1}	側管div(30分で)
	H ₂ Blocker 1A	
	ポララミン 5mg	
	5-HT ₃ RB 1A	
Rp.3	アービタックス 400mg/m ² (2回目~250mg/m ²)	側管div(2時間で) (※2回目から1時間で)
	生理食塩水 250mL	
Rp.4	生理食塩水 100mL	側管div(30分で)
Rp.5	カルボプラチン (AUC:5)×(GFR+25)	側管div(2時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.6	マンニトールS 300mL	側管div(30分で)
Rp.7	ラシックス注 20mg	one shot iv
Rp.8	生理食塩水 500mL	側管div(6時間で)

〈day2~4〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソルデム3A 1000mL	div(24時間持続)
	フルオロウラシル 800~1000mg/m ²	
Rp.2	デキサート 6.6mg ^{※1}	側管div(30分で)
	生理食塩水 100mL	

〈day8,15〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	生理食塩水 100mL	div(30分で)
Rp.2	デキサート 6.6mg	div(30分で)
	ポララミン 5mg	
Rp.3	生理食塩水 100mL	div(1時間で)
	アービタックス 250mg/m ²	
	生理食塩水 250mL	

【参考文献:]

【備考:※1…デキサートの投与量は、イメンドカプセル併用時の量で設定してあります。イメンド不要時はデキサート倍量。]

【用法1頁報:]

]