

【 診療科: 口腔外科 】

【 レジメン登録番号: OS-08 】

〈 weeklyパクリタキセル+アービタックス療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)							
			1	.....	.....	.....	.....	.....	7	
アービタックス	400mg/m <sup>2</sup> (2回目~250mg/m <sup>2</sup> )	div	○							
パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	div	○							

【1コース期間: 7日】

【総コース数: 規定なし】

【適応癌種: 頭頸部癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	生理食塩水 100mL	ルートキープ及び終了後フラッシュ用
Rp.2	デキサート 6.6mg	div(全開で)
	H <sub>2</sub> Blocker 1A	
	ボラミン 5mg	
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	アービタックス 初回400mg/m <sup>2</sup> (2回目~250mg/m <sup>2</sup> )	div(初回2時間で) (2回目~1時間で)
	生理食塩水 250mL	
Rp.4	生理食塩水 100mL	div(30分で)
Rp.5	パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup>	div(90分で)
	生理食塩水 250mL	

【参考文献: Phase II study of the combination of cetuximab and weekly paclitaxel in the first-line treatment of patients with recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of head and neck. Ann Oncol.2012.23;1016-22】

【参考文献: Efficacy and safety of weekly paclitaxel combined with cetuximab in the treatment of pretreated recurrent/metastatic head and neck cancer patients. Oral Oncol.2013.49;182-185】

【備考:

【変法情報:

】  
】