

【 診療科:乳腺外科 】  
 【 レジメン登録番号:SB-13 】

〈 weeklyPTX+Trastuzumab(q3w)療法 〉

|           | 投与量                    | 投与経路 | 投与スケジュール(day) |   |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |     |   |   |   |
|-----------|------------------------|------|---------------|---|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|
|           |                        |      | 1             | 8 | 15 | 22  | 29 | 36 | 43 | 50 | 57  | 64 | 71 | 78 | 84  |   |   |   |
| パクリタキセル   | 80mg/m <sup>2</sup>    | div  | ○             | ○ | ○  | (○) | ○  | ○  | ○  | ○  | (○) | ○  | ○  | ○  | (○) | ○ | ○ | ○ |
| トラスツズマブBS | 初回 8mg/kg<br>以降 6mg/kg | div  | ○             |   |    | ○   |    |    | ○  |    |     | ○  |    |    | ○   |   |   | ○ |

【1コース期間: 84日】 【総コース数: コース】

【適応癌種: 乳癌】

【時期: 術前、術後、**手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
|    |    |      |          |

投与プロトコール

<day1, (22), 43, 64>

| Rp   | 薬剤名  | 投与経路(速度)                     |
|------|--|------------------------------|
| Rp.1 | ポラミン 5mg<br>生理食塩水 50mL   | div(全開で)                     |
| Rp.2 | デキサート 6.6mg※1<br>H <sub>2</sub> R Blocker<br>( 5-HT <sub>3</sub> R Blocker )<br>生理食塩水 50mL | div(全開で)                     |
| Rp.3 | パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup><br>5%ブドウ糖液 250mL   | div(1時間で)                    |
| Rp.4 | 生理食塩水 50mL   | div(全開で)                     |
| Rp.5 | トラスツズマブBS初回<br>8mg/kg<br>以降 6mg/kg<br>生理食塩水 250mL  | div(初回90分で)<br>(2回目から30分でも可) |
| Rp.6 | 生理食塩水 50mL   | div(全開で)                     |

<day8, 15, 29, 36, (50), 57, 71, (78)>

| Rp   | 薬剤名  | 投与経路(速度)  |
|------|--|-----------|
| Rp.1 | ポラミン 5mg<br>生理食塩水 50mL   | div(全開で)  |
| Rp.2 | デキサート 6.6mg※1<br>H <sub>2</sub> R Blocker<br>( 5-HT <sub>3</sub> R Blocker )<br>生理食塩水 50mL | div(全開で)  |
| Rp.3 | パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup><br>5%ブドウ糖液 250mL   | div(1時間で) |
| Rp.4 | 生理食塩水 50mL   | div(全開で)  |

<day22>

| Rp   | 薬剤名                             | 投与経路(速度)  |
|------|---------------------------------|-----------|
| Rp.1 | トラスツズマブBS 6mg/kg<br>生理食塩水 250mL | div(30分で) |
| Rp.2 | 生理食塩水 50mL                      | div(全開で)  |

【参考文献: 乳癌診療ガイドライン等】

【備考①: パクリタキセルは、3週投与1週休薬の場合と、毎週投与の場合がある。】

【備考②: ※1: パクリタキセル2回目以降、デキサート3.3mgでも可。】

【変法情報:】