

【 診療科:乳腺外科 】

【 レジメン登録番号:SB-17 】

〈 Trastuzumab(q3w) + Eribulin 療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)			
			1	8	15	21
トラスツズマブBS	初回 8mg/kg 以降 6mg/kg	div	○			
ハラヴェン	1.4mg/m <sup>2</sup>	div	○	○		

【1コース期間: 21日】

【総コース数: コース】

【適応癌種: 乳癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	トラスツズマブBS初回 8mg/kg 以降 6mg/kg	div(初回90分で) (2回目から30分でも可)
	生理食塩水 250mL	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.3	ハラヴェン 1.4mg/m <sup>2</sup>	div(全開、5分以内で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(全開で)

<day8>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ハラヴェン 1.4mg/m <sup>2</sup>	div(全開、5分以内で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(全開で)

【参考文献:

【備考:

【変法情報:

】  
】  
】