

【 診療科:乳腺外科 】
 【 レジメン登録番号:SB-33】

〈 nab-PTX+Bevacizumab療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)							
			1	8	15	28	
アブラキサン	90~150mg/m ²	div	○		○		○			
アバステン	10mg/kg	div	○				○			

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: 制限なし】

【適応癌種: 手術不能または再発乳癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

<day1, 15>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 3.3mg	div(30分で)
	生理食塩液 50mL	
Rp.2	アブラキサン 90~150mg/m ²	div(30分で)
	生理食塩液 100mL	
Rp.3	生理食塩液 50mL	div(全開で)
Rp.4	アバステン 10mg/kg	div(90分で) ^{※1}
	生理食塩水 100mL	
Rp.5	生理食塩水 50mL	div(5分で)

<day8>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 3.3mg	div(30分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	アブラキサン 90~150mg/m ²	div(30分で)
	生理食塩液 50mL	
Rp.3	生理食塩水 50mL	div(全開で)

【参考文献:1)アブラキサン点滴静注用・アバステン点滴静注用添付文書
 【 :2)J Clin Oncol 2015;33:2361-69
 【備考:※1:初回90分で投与、2回目は60分でも可、3回目以降は30分でも可

】
 】【
 】【