

【 診療科:乳腺外科 】

【 レジメン登録番号:SB-35 】

## 〈 Pembrolizumab療法(悪性黒色腫)、乳癌(TNBC) 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)	
			1	21
キイトルーダ	200mg/body	div	○	

【1コース期間: 21 日】

【総コース数: 制限無し<sup>※1</sup>】

【適応癌種: 悪性黒色腫、乳癌(TNBC)】

【時期: 術前 **術後** **手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

### 投与プロトコール

〈第1日目〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	キイトルーダ 200mg	div(30分で) <sup>※3</sup>
	生理食塩水 100mL <sup>※2</sup>	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(30分で)

【参考文献:N Engl J Med.2022;386:556-67、キイトルーダ点滴静注 添付文書】

【備考:※1 乳癌の術後補助化学療法に用いる場合は、9コースまでとする。】

【備考:※2 最終濃度が1~10mg/mLとなるように調製すること。】

【備考:※3 インラインフィルター(0.2~5μm)を用いて投与すること。】