

【 診療科:消化器外科 】

【 レジメン登録番号:SG-115 】

< S-1+gemcitabine療法(膵臓癌用) >

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|--------|----|--|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 14 | | 21 | | | |
| ジェムザール | 1000mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| S-1 | BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA≤1.5m ² 100mg/day BSA>1.5m ² 120mg/day | p.o. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ←継続投与→ | ○ | | | |

【1コース期間: 21 日】

【総コース数:術前は2コースまで】

【適応癌種: 膵臓癌】

【時期: 術前、術後 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
| | | | |
| | | | |

投与プロトコール

【day1,8】

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|--------------------------------|-----------|
| Rp.1 | 5-HT ₃ R Blocker 1A | div(15分で) |
| | デキサート 3.3mg | |
| | 生理食塩水 100mL | |
| Rp.2 | ジェムザール 1000mg/m ² | div(30分で) |
| | 5%ブドウ糖液 100mL | |

【参考文献: JJCO,2019,49(2)190-194,膵癌診療ガイドライン 2019年度版】

【備考:】

【変法情報:】