【 診療科：消化器外科 】
【 レジメン登録番号：SG-34 】

〈 IRIS療法【大腸癌用】 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール（day）											
			1	2	3	4	5	6	7	・・・・・	14	15	・・・・	28
イリノテカン	125mg/㎡	div	○									○		
TS-1	80～120mg/body	p.o.	○	○	○	○	○	○	○	←継続投与→	○			

【1コース期間： 28 日】　　【総コース数： コース】

【適応癌種： 切除不能大腸癌 】

【時期： 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
WBC	3,000以下	中止	3,000以上
Plt	10万以下	中止	10万以上
T-Bil	3以上	中止	3以下

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路（速度）
Rp.1	YDソリタT3 200mL	div（80mL/h） 終了後抜針，残破棄
Rp.2	デキサート 6.6mg	div（30分で）
	5-HT_3R Blocker 1A	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	イリノテカン 125mg/㎡	div（90分で）
	生理食塩水 500mL	

【参考文献：無作為第Ⅲ相試験（FIRIS study）でFOLFIRIに対し非劣性が証明されている 】
【備考：TS-1投与量 BSA＜1.25㎡,80mg/day；1.25≦BSA＜1.5,100mg/day；BSA≧1.5,120mg/day 】
【変法情報： 】