

【 診療科:消化器外科 】
 【 レジメン登録番号:SG-67 】

〈 CDDP+CPT-11療法【食道癌用】 〉

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|-------|----|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 15 | | 28 | | |
| イリノテカン | 60mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | ○ |
| シスプラチン | 60mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | | | | | |

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: 制限なし】

【適応癌種: 食道癌】

【時期: 術前、術後 **手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
| | | | |
| | | | |

投与プロト

<day1>

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|--------|--------------------------------|--------------------------|
| Rp.1 | デキサート 6.6mg | div(30分で) |
| | 5-HT ₃ R Blocker 1A | |
| | 生理食塩水 100mL | |
| Rp.2 | イリノテカン 60mg/m ² | div(60分で) |
| | 5%ブドウ糖液 250mL | |
| Rp.3 | 生理食塩水 500mL | div(120分で) |
| Rp.4 | シスプラチン 60mg/m ² | div(120分で) |
| | 生理食塩水 計500mL※ | |
| Rp.5-① | マンニトールS 300mL | Rp.5-②と同時に側管からdiv(240分で) |
| Rp.5-② | ソリューゲンF 500mL | div(120分で) |
| Rp.6 | ソリューゲンF 500mL | div(120分で) |
| Rp.7 | ソリューゲンF 500mL | div(40mL/hで) |

<day2,3>

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|--------------------------------|-----------|
| Rp.1 | ソリューゲンF 500mL | div(6時間で) |
| Rp.2 | ソリューゲンF 500mL | div(6時間で) |
| Rp.3 | デキサート 6.6mg | div(30分で) |
| | 5-HT ₃ R Blocker 1A | |
| | 生理食塩水 100mL | |
| Rp.4 | ソリューゲンF 500mL | div(6時間で) |
| Rp.5 | ソリューゲンF 500mL | div(6時間で) |

※下記備考欄参照<day8,15>

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|--------------------------------|-----------|
| Rp.1 | 5-HT ₃ R Blocker 1A | div(30分で) |
| | デキサート 6.6mg | |
| | 生理食塩水 100mL | |
| Rp.2 | イリノテカン 60mg/m ² | div(60分で) |
| | 5%ブドウ糖液 250mL | |

【参考文献: Jpn J Cancer Chemother 36(5):831-834,2009】

【備考: 第1日目Rp.6はシスプラチンと生理食塩水を合わせて500mLとなるように、生理食塩水の量を調整する。】

【変法情報:】