

【 診療科:消化器外科 】
 【 レジメン登録番号:SG-73 】

〈 XELOX療法(胃癌) 〉

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | | |
|----------|---|------|-----------------------------|---|---|---|-------|----|----|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 14 | 15 | |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | div | ○ | | | | | | | |
| ゼローダ | <1.36m ² 1,200mg/回 1.36~1.66m ² 1,500mg/回 1.66~1.96m ² 1,800mg/回 1.96m ² ≤ 2,100mg/回 | p.o. | 夕 ← 1日2回 朝・夕食後 → 朝 2週間投与 | | | | | | | |

【1コース期間: 21 日】

【総コース数:制限なし】

【適応癌種: 胃癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|-----------------|----|------|----------|
| ※ゼローダ錠適正使用ガイド参照 | | | |

投与プロトコール

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|--------------------------------|-------------|
| Rp.1 | YDソリタT3 200mL | div(40mL/h) |
| Rp.2 | 5-HT ₃ R Blocker 1A | div(全開で) |
| | デキサート 9.9mg | |
| | 生理食塩水 100mL | |
| Rp.3 | オキサリプラチン 130mg/m ² | div(2時間で) |
| | 5%ブドウ糖液 250mL | |

【参考文献①: N Engl J Med 2008;358:36-46.】

【参考文献②: Ann Oncol 2006;17:29-34.】

【参考文献③: 切除不能進行・再発胃癌に対するオキサリプラチンの適応拡大について(日本胃癌学会)】

【備考:ゼローダ投与は分2、day1夕食後~day15朝食後

】