

【 診療科:消化器外科 】  
 【 レジメン登録番号:SG-78 】

## 〈 アバスチン+ゼローダ療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)							
			1	2	3	4	.....	14	15	.....
アバスチン	7.5mg/kg	div	○							
ゼローダ	$< 1.36\text{m}^2$ 1,200mg/回 $1.36 \sim 1.65\text{m}^2$ 1,500mg/回 $1.66 \sim 1.95\text{m}^2$ 1,800mg/回 $1.96\text{m}^2 \leq$ 2,100mg/回	p.o.	夕	← 1日2回 朝・夕食後 → 2週間投与					朝	

【1コース期間: 21 日】

【総コース数:制限なし】

【適応癌種: 大腸癌】

【時期: 術前、術後、**手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
※ゼローダ錠適正使用ガイド参照			

### 投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	アバスチン 7.5mg/kg	div
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(全開で)

※初回90分、2回目は60分でも可。  
3回目以降は30分でも可。

【参考文献:Lancet Oncol.2013;14(11):1077-85

【備考:ゼローダ投与は分2、day1夕食後～day15朝食後

】