

【 診療科:泌尿器科 】  
 【 レジメン登録番号:UR-28】

〈 PTX+GEM療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)															
			1	2	3	4	5	6	7	8	.....	15	....	28				
パクリタキセル	180mg/m <sup>2</sup>	div	○															
ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	div	○							○				○				

【1コース期間: 28日】      【総コース数: コース】

【適応癌種: 尿路上皮癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	生理食塩水 100mL	div(ルートキープ用)
Rp.2	ポラミン 5mg	div(全開で)
	デキサート 19.8mg	
	ガスター 20mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	パクリタキセル 180mg/m <sup>2</sup>	div(3時間で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.5	ジェムザール 1000mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
	5%ブドウ糖 100mL	
Rp.6	生理食塩水 50mL	div(全開で)

<day8、15>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	生理食塩水 100mL	div(ルートキープ用)
Rp.2	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	div(15分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	ジェムザール 1000mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
	5%ブドウ糖 100mL	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(全開で)

【参考文献:Jpn J Clin Oncol. 2009;39(4):244-50】

【備考:シスプラチンを使用した化学療法に抵抗を示した患者のみ投与可能】

【変法情報:】