

【 診療科: 泌尿器科 】  
 【 レジメン登録番号: UR-29】

### 〈 GEM+CBDCA療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)														
			1	2	3	4	5	6	7	8	.....	15	....	28			
ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	div	○									○			○		
カルボプラチン	AUC5	div	○														

【1コース期間: 28日】                      【総コース数: 6コース】

【適応癌種: 尿路上皮癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

#### 投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	生理食塩水 100mL	div(ルートキープ用)
Rp.2	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	div(15分で)
	デキサート 6.6mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	ジェムザール 1000mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
	5%ブドウ糖 100mL	
Rp.4	カルボプラチン AUC5	div(60分で)
	5%ブドウ糖 250mL	
Rp.5	生理食塩水 50mL	div(全開で)

<day8、15>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	生理食塩水 100mL	div(ルートキープ用)
Rp.2	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	div(15分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	ジェムザール 1000mg/m <sup>2</sup>	div(30分で)
	5%ブドウ糖 100mL	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(全開で)

【参考文献: Cancer 2006; 106(2): 297-303

【備考: イメンドを併用する場合は、デキサートの投与量を3.3mgに減量すること。

【変法情報:

】  
 】【  
 】【