

【 診療科:消化器内科】  
 【 レジメン登録番号:IA-37 】

## 〈GEM＋タルセバ療法〉

|        | 投与量                    | 投与経路 | 投与スケジュール(day) |   |   |   |   |   |   |   |        |    |        |    |
|--------|------------------------|------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|--------|----|
|        |                        |      | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .....  | 15 | ....   | 28 |
| ジェムザール | 1,000mg/m <sup>2</sup> | div  | ○             |   |   |   |   |   |   | ○ |        | ○  |        |    |
| タルセバ   | 100mg                  | p.o. | ○             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ←継続投与→ | ○  | ←継続投与→ | ○  |

【1コース期間: 28 日】 【総コース数:規定なし】

【適応癌種: 膵臓癌】

【時期: 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
|    |    |      |          |
|    |    |      |          |

### 投与プロトコール

<第1, 8, 15日目>

| Rp   | 薬剤名                            | 投与経路(速度)  |
|------|--------------------------------|-----------|
| Rp.1 | 5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A | div(30分で) |
|      | デキサート 3.3mg                    |           |
|      | 生理食塩水 100mL                    |           |
| Rp.2 | ジェムザール 1,000mg/m <sup>2</sup>  | div(30分で) |
|      | 5%ブドウ糖液 100mL                  |           |

【参考文献: J Clin Oncol 2007;25;1960-66.

【備考:

】

】