

【診療科:婦人科】

【レジメン登録番号:GY-44】

〈 Pembrolizumab±Bevacizumab療法(q6W)(維持療法) 〉

|        | 投与量        | 投与経路 | 投与スケジュール(day) |   |   |   |   |   |   |       |    |       |    |  |
|--------|------------|------|---------------|---|---|---|---|---|---|-------|----|-------|----|--|
|        |            |      | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ..... | 22 | ..... | 42 |  |
| キイトルーダ | 400mg/body | div  | ○             |   |   |   |   |   |   |       |    |       |    |  |
| アバスチン  | 15mg/kg    | div  | ○             |   |   |   |   |   |   |       |    |       |    |  |

【1コース期間: 42日】

【総コース数: 制限なし】

【適応癌種: 子宮頸癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
|    |    |      |          |
|    |    |      |          |

投与プロトコール

〈day1〉

| Rp   | 薬剤名           | 投与経路(速度)  |
|------|---------------|-----------|
| Rp.1 | キイトルーダ 400mg  | div(30分で) |
|      | 生理食塩液 100mL   |           |
| Rp.2 | 生理食塩液 50mL    | div(10分で) |
| Rp.3 | アバスチン 15mg/kg | div(30分で) |
|      | 生理食塩水 100mL   |           |

【参考文献: N Engl J Med 2021;385: 1856-1867、キイトルーダ添付文書】

【備考: GY-42: Pembrolizumab+TC±Bevacizumab療法またはGY-43: Pembrolizumab+TP±Bevacizumab療法 7コース目以降の6週ごとの維持療法用】