

【診療科:脳神経外科】
 【レジメン登録番号:SN-02】

〈 Temozolomide療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)															
			1	2	3	4	5	6	7		28							
テモダール	150mg/m ²	div	○	○	○	○	○											

【1コース期間:28日】

【総コース数:制限なし】

【適応癌種:悪性神経膠腫(再発)】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp.1	イメンドカプセル 125mg	p.o.
Rp.2	生理食塩水 100mL	div(ルートキープ用)
Rp.3	デキサート 3.3mg	div(15分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.4	テモダール 150mg/m ² * ^{※1}	div(90分で)
	注射用水 1Vあたり41mL	
	生理食塩水 200mL	
Rp.5	生理食塩水 100mL	全開で

<day2~5>

Rp.1	イメンドカプセル 80mg	p.o.(day2~3のみ)
Rp.2	生理食塩水 100mL	div(ルートキープ用)
Rp.3	デキサート 3.3mg	div(15分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.4	テモダール 150mg/m ² * ^{※1}	div(90分で)
	注射用水 1Vあたり41mL	
	生理食塩水 200mL	
Rp.5	生理食塩水 100mL	全開で

【備考※1:2クール目以降、200mg/m²に増量することが可能。】

【変法情報:】