

【 診療科:消化器外科 】  
【 レジメン登録番号:SG-139 】

〈 SP+Pembrolizumab療法 〉

|        | 投与量                                                                                                        | 投与経路 | 投与スケジュール(day) |   |   |   |   |          |   |   |       |    |      |    |   |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|---|---|---|----------|---|---|-------|----|------|----|---|--|--|
|        |                                                                                                            |      | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6        | 7 | 8 | ..... | 15 | .... | 21 |   |  |  |
| キイトルーダ | 200mg/body                                                                                                 | div  | ○             |   |   |   |   |          |   |   |       |    |      |    |   |  |  |
| シスプラチン | 60mg/m <sup>2</sup>                                                                                        | div  | ○             |   |   |   |   |          |   |   |       |    |      |    |   |  |  |
| S-1    | BSA<1.25m <sup>2</sup> 80mg/day<br>1.25≤BSA<1.5m <sup>2</sup> 100mg/day<br>BSA≥1.5m <sup>2</sup> 120mg/day | p.o. | タ             |   |   |   |   | ← 継続投与 → |   |   |       |    |      |    | 朝 |  |  |

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: 制限なし】

【適応癌種: 胃癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
|    |    |      |          |
|    |    |      |          |

投与プロトコル

|          |       |                                |           |
|----------|-------|--------------------------------|-----------|
| <day1>   | Rp    | 薬剤名                            | 投与経路(速度)  |
|          | Rp.1  | フィジオ140 500mL                  | div(90分で) |
|          | Rp.2  | フィジオ140 500mL                  | div(90分で) |
|          | Rp.3  | キイトルーダ 200mg/body              | div(30分で) |
|          |       | 生理食塩水 100mL                    |           |
|          | Rp.4  | 生理食塩水 50mL                     | div(全開で)  |
|          | Rp.5  | 5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A | div(15分で) |
|          |       | デキサート 9.9mg                    |           |
|          |       | 生理食塩水 100mL                    |           |
|          | Rp.6  | マンニトールS 300mL                  | div(30分で) |
| <day2,3> | Rp.7  | シスプラチン 60mg/m <sup>2</sup>     | div(2時間で) |
|          |       | 生理食塩水 500mL                    |           |
|          | Rp.8  | リナセートF 500mL                   | div(90分で) |
|          | Rp.9  | リナセートF 500mL                   | div(90分で) |
|          | Rp.10 | リナセートF 500mL                   | div(90分で) |
|          | Rp    | 薬剤名                            | 投与経路(速度)  |
|          | Rp.1  | デキサート 6.6mg                    | div(15分で) |
|          |       | 生理食塩水 100mL                    |           |

【参考文献:Cancer Science.2022;113:2814-2827. 】

【備考:S-1投与は分2、day1夕食後～day15朝食後 】

【備考:Rp.6の生理食塩水は、シスプラチンと合わせて500mLとなるようにする。 】

【変法情報: 】