【 診療科:呼吸器内科 】
【 レジメン登録番号:IP-13 】

〈 PEM(アリムタ)単剤療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	・・・・・	15	・・・・	21
アリムタ	500mg/㎡	div	○											

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: 】

【適応癌種: 悪性胸膜中皮腫・非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) 】

【時期: 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発 】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
WBC	3,000μL/未満	中止	
Plt	100,000/μL未満	中止	

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 6.6mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	アリムタ 500mg/㎡	div(10分で)
	生理食塩水 100mL	

【参考文献: 】
【備考:重篤な副作用の発現を軽減するため、葉酸及びビタミンB_{12}を投与すること。 】
【 ※葉酸:本剤初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。
なお、本剤の投与を中止又は終了する場合には、本剤最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。
】
【 ※ビタミンB12:本剤初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。
その後、本剤投与期間中及び投与中止後22日目まで9週毎(3コース毎)に1回投与する。
】
【変法情報: 】