

【 診療科:婦人科 】

【 レジメン登録番号:GY-27 】

### < CCRT(同時化学放射線療法) >

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)						
			1	2	3	4	.....	7	
シスプラチン	40mg/m <sup>2</sup>	div	○						

【1コース期間: 7 日】

【総コース数: 6 コース】

【適応癌種: 子宮頸癌 】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
白血球数	3000以下	80%量	3000以上
血小板数	10万以下	中止	10万以上

#### 投与プロトコール

< day1 >

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソララクト 500mL	div(120mL/h)
Rp.2	ソルデム3A 1000mL	div(120mL/h) <sup>※1</sup>
	静注用マグネゾール 1A	
Rp.3	5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A	側管div(30分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.4	デキサート 9.9mg <sup>※3</sup>	div(30分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.5	シスプラチン 40mg/m <sup>2</sup>	div(3時間で)
	生理食塩水 500mL <sup>※2</sup>	
Rp.6	マンニトールS 300mL	div(300mL/h)
Rp.7	ソララクト 500mL	div(120mL/h)
Rp.8	ソルデム3A 1000mL	div(120mL/h) <sup>※3</sup>
	静注用マグネゾール 1A	

< day2 >

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソルデム3A 1000mL	div(120mL/h)
	テルペラン 10mg	
Rp.2	ソルデム3A 1000mL	div(120mL/h)
	テルペラン 10mg	
Rp.3	デキサート 6.6mg <sup>※3</sup>	div(30分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.4	ソルデム3A 1000mL	div(120mL/h)

【参考文献: 子宮頸癌治療ガイドライン2011 】

【備考: ※1...シスプラチン開始時まで終了。残破棄。 】

【備考: ※2...第1日目のRp.4の生理食塩水の量はシスプラチンと合わせて500mLとなるよう適宜調製可。 】

【備考: ※3...0時で残破棄して、更新。 】

【備考: 複数のランダム化比較試験(RCT)とメタアナリシスにより局所進行子宮頸癌に対するCCRTの有効性が示されている。 】

【備考: ※3...デキサートの投与量は、イメンドカプセル併用時の量で設定してあります。イメンド不要時はデキサート倍量。 】