

【 レジメン登録番号:GY-30 】

〈 PLD+Bevacizumab療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)									
			1	2	3	4	5		15		28	
ベバシズマブBS	10mg/kg	div	○							○		
ドキシル	40mg/m ²	div	○									

【総コース数: コース】

【適応癌種：卵巣癌】

【時期：術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ベバシズマブBS 10mg/kg	div(初回90分、2回目60分、3回目以降30分でも可)
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	デキサート 6.6mg	div(15分で)
	5%ブドウ糖 50mL	
Rp.3	ドキシル 40mg/m ²	div(1mg/分で)
	5%ブドウ糖 250 mL	
Rp.4	5%ブドウ糖 50 mL	div(フラッシュ用、全開で)

<day15>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ペバシズマブBS 10mg/kg	div(初回90分、2回目60分、 3回目以降30分でも可)
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	生理食塩水 50 mL	div(フラッシュ用、全開で)

【参考文献: J Clin Oncol.2014 : 32 ; 1302-1308

【備考:ドキシルはフィルター通さずに投与すること。また溶解は5%Gluのみ可。】

【変法情報:ベバシズマブBSを15mg/kgで4週毎行う場合もある。