

【診療科:泌尿器科】
【レジメン登録番号:UR-09】

〈 EP療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		21							
シスプラチン	20mg/m ²	div	○	○	○	○	○													
エトポシド	100mg/m ²	div	○	○	○	○	○													

【1コース期間: 21日】 【総コース数: コース】

【適応癌種: 精巣腫瘍】

【時期: 術前、術後 **手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソルデム3A 1,000mLx3袋	維持div(120mL/h)
Rp.2	5-HT ₃ R Blocker 1A ^{※1}	div(15分で)
	デキサート 9.9mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	マンニトールS 300mL	div(60分で)
Rp.4	シスプラチン 20mg/m ²	div(120分で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.5	エトポシド 100mg/m ²	div(60分で)
	5%Glu 500mL	
Rp.6	リナセートF 500mL	div(60分で)
	ラシックス注 20mg	

<day2~5>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ソルデム3A 1,000mLx3袋	維持div(120mL/h)
Rp.2	5-HT ₃ R Blocker 1A ^{※1}	div(15分で)
	デキサート 6.6mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	マンニトールS 300mL	div(60分で)
Rp.4	シスプラチン 20mg/m ²	div(120分で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.5	エトポシド 100mg/m ²	div(60分で)
	5%Glu 500mL	
Rp.6	リナセートF 500mL	div(60分で)
	ラシックス注 20mg	

【参考文献:

【備考①: ※1…アロキシを使用した場合は、原則 5HT₃RB のday2~5の投与は行わない。

【備考: イメンドを併用すること。併用しない場合、デキサートを倍量にする。】

【変法情報:

】
】
】