

【 診療科:婦人科 】  
 【 レジメン登録番号:GY-31 】

## 〈 Cisplatin+Paclitaxel(TP)+Bevacizumab療法 〉

|         | 投与量                  | 投与経路 | 投与スケジュール (day) |   |   |   |   |   |   |   |       |    |      |    |  |
|---------|----------------------|------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|------|----|--|
|         |                      |      | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ..... | 15 | .... | 21 |  |
| アバスチン   | 15mg/kg              | div  | ○              |   |   |   |   |   |   |   |       |    |      |    |  |
| パクリタキセル | 175mg/m <sup>2</sup> | div  | ○              |   |   |   |   |   |   |   |       |    |      |    |  |
| シスプラチン  | 50mg/m <sup>2</sup>  | div  | ○              |   |   |   |   |   |   |   |       |    |      |    |  |

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: 規定なし】

【適応癌種: 子宮頸癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
|    |    |      |          |
|    |    |      |          |

### 投与プロトコール

〈第1日目〉

| Rp   | 薬剤名                            | 投与経路(速度)                    |
|------|--------------------------------|-----------------------------|
| Rp.1 | アバスチン 15mg/kg                  | div(初回90分、2回目60分、3回目以降30分で) |
|      | 生理食塩水 100mL                    |                             |
| Rp.2 | ポララミン 5mg                      | div(全開で)                    |
|      | デキサート 9.9mg                    |                             |
|      | ファモチジン 20mg                    |                             |
|      | 生理食塩水 100mL                    |                             |
| Rp.3 | 5-HT <sub>3</sub> R Blocker 1A | div(30分で)                   |
|      | 生理食塩水 100mL                    |                             |
| Rp.4 | パクリタキセル 175mg/m <sup>2</sup>   | div(3時間で)                   |
|      | 生理食塩水 500mL                    |                             |
| Rp.5 | フィジオ140 500mL                  | div(1時間で)                   |
| Rp.6 | シスプラチン 50mg/m <sup>2</sup>     | div(2時間で)                   |
|      | 生理食塩水 500mL※1                  |                             |
| Rp.7 | マンニトールS 300mL                  | div(1時間で)                   |
| Rp.8 | 生理食塩水 500mL                    | div(2時間で)                   |
| Rp.9 | リナセートF 500mL                   | div(2時間で)                   |

【参考文献: N Engl J Med 2014;370:734-43、アバスチン点滴静注用添付文書、タキソール注射液添付文書】

【備考: ※1・・・第1日目のRp.6の生理食塩水の量はシスプラチンと合わせて500mLとなるようにする】

【備考: 2・・・アプレピタントを併用する。】

【変法情報: 〃】