

【 診療科:呼吸器内科 】

【 レジメン登録番号:IP-43 】

〈 Nivolumab+Ipilimumab療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)				
			1		22		42
オプジーボ	360mg/body	div	○		○		
ヤーボイ	1mg/kg	div	○				

【1コース期間: 42日】

【総コース数:規定なし】

【適応癌種:非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

〈day1〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	オプジーボ 360mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL ^{※1}	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(30分で)
Rp.3	ヤーボイ 1mg/kg	div(30分で)
	生理食塩水 30mL ^{※2}	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(30分で)

〈day22〉

Rp	薬品名	投与速度
Rp.1	オプジーボ 360mg	div(30分で)
	生理食塩水 100mL ^{※1}	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(全開で)

【参考文献:オプジーボ点滴静注添付文書、ヤーボイ点滴静注液添付文書、N Engl J Med 2019;381:2020-31】

【備考:※1 投与時の総液量は体重30kg 以上の患者には150mL 以下、体重30kg 未満の患者には100mL 以下とする。】

【備考:※2 ヤーボイは最終濃度が1~4mg/mLとなるように希釈すること。】

【備考: オプジーボとヤーボイはインラインフィルター(0.2又は0.22 μm)を用いて投与すること。】