

【診療科:消化器外科】

【レジメン登録番号:SG-137】

〈SOX+Pembrolizumab療法〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)											
			1	2	3	4	5	6	7	8		15		21
キイトルーダ	200mg/body	div	○											
オキサリプラチン	130mg/m ²	div	○											
S-1	BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25≤BSA<1.5m ² 100mg/day BSA≥1.5m ² 120mg/day	p.o.	タ	←継続投与→							朝			

【1コース期間: 21 日】

【総コース数: 制限無し】

【適応癌種: 胃癌】

【時期: 術前、術後 **手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
ティーエスワン添付文書参照			

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	キイトルーダ 200mg/body	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.3	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(全開で)
	デキサート 9.9mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	オキサリプラチン 130mg/m ²	div(2時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	

【参考文献:Cancer Science.2022;113:2814-2827.】

【備考: S-1投与は分2、day1夕食後～day15朝食後】